

Bicarlyte Powder

Thức ăn bổ sung chứa chất mang Natri bicarbonate, chất điện giải và vitamin C



CHỈ ĐỊNH:

Stress nhiệt, tiêu chảy và một số bệnh dẫn đến mất chất điện giải nghiêm trọng. Royal Avian Bicarlyte Powder được sử dụng để ngăn ngừa nhiễm toan trong quá trình chuyển hóa, do mất chất điện giải, đồng thời chống giảm năng suất và tử vong. Nó có thể được hòa tan hoàn toàn trong nước.



THÀNH PHẦN:

Mỗi kg sản phẩm có chứa:

- Độ ẩm: 2 - 9 %
- Potassium (K) (as Potassium chloride): 19.1 % – 23.2 %
- Clor (Cl) (as Potassium chloride): 18.7 % - 22.5 %
- Vitamin C (Ascorbic acid): Min 55000 mg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Royal Avian Bicarlyte Powder được sử dụng để hỗ trợ loại bỏ nhiễm toan trong quá trình chuyển hóa do mất chất điện giải và cung cấp chất điện giải. Sản phẩm được hòa tan hoàn toàn trong nước.

Sản phẩm có thể được trộn với thức ăn hoặc nước uống cho tất cả các loại gia cầm. Nếu sản phẩm sử dụng qua nước uống, pha 1 kg bột Bicarlyte trong 5-10 lít nước và sau đó đổ vào bể/ nguồn nước chính hoặc cho hút qua Dosatron.

Đối với mục đích bảo vệ, trong quá trình mất nước và giảm trọng trong quá trình vận chuyển:

Dùng 1 kg sản phẩm cho 500 lít nước hoặc 2kg cho 1 tấn thức ăn, sử dụng liên tục trong 5-10 ngày

Mất nước nhẹ: Dùng 1 Kg sản phẩm cho 150 lít nước hoặc 5 kg cho 1 tấn thức ăn. Sử dụng liên tục trong 5-10 ngày

Mất nước nặng và stress nhiệt nghiêm trọng: 1kg Bicarlyte Powder cho 100 lít nước hoặc 6-10 kg cho 1 tấn thức ăn. Sử dụng liên tục trong 5-7 ngày



Quy cách: 5 Kg and 10 Kg

NHÀ SẢN XUẤT:



ROYAL ILAC SAN. VE TIC. LTD. STI.
Organize San. Bolgesi 23.Cadde No:5
Melikgazi Kayseri Turkey.

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:



CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: +84.28 6685 0901 – Email: info@eastvet.vn

