

Chỉ dùng trong thú y

FX PLUS® 20 INJECTABLE SOLUTION

Dạng sản phẩm: Dung dịch tiêm.

Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm dưới da.

Thành phần: Sản phẩm có chứa 20% Fosfomycin.

Mỗi ml sản phẩm có chứa:

Fosfomycin base200.0 mg

Tá dược vừa đủ.....1.0 ml

Loài được chỉ định: Gia cầm, trâu bò, dê và cừu.

Chỉ định:

Fx plus® 20 Injectable Solution là một kháng sinh phổ rộng thuộc nhóm các dẫn xuất của acid phosphonic, được chỉ định điều trị các bệnh do vi khuẩn ở gia cầm và động vật nhai lại ở bất kỳ độ tuổi nào gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Fosfomycin như: *Pasteurella* spp, *Haemophilus* spp, *E. coli*, *Salmonella* spp, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Pseudomonas* spp, *Klebsiella* spp, *Actinobacillus* spp, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Proteus* spp và *Shigella* spp.

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng:

Gia cầm:

- Gà con 1 ngày tuổi: 20 mg hoạt chất / 1 kg thể trọng. Pha 4 ml dung dịch Fx plus® 20 Injectable Solution với 200 ml dung môi vaccine Marek. Dung dịch sau khi pha được sử dụng ngay cho gà con 1 ngày tuổi với liều 0.2 ml / con bằng đường tiêm dưới da.
- Gà con 1 tuần tuổi trở lên: 10 mg hoạt chất / kg thể trọng bằng đường tiêm bắp hoặc tiêm dưới da, tương đương 1 ml sản phẩm Fx plus® 20 Injectable Solution cho 20 kg thể trọng.
- Sản phẩm này có thể được sử dụng bằng cách pha vào nước vô trùng để đáp ứng liều mong muốn theo các loại cân nặng (xem bảng sau). Dung dịch sau pha nên được sử dụng ngay với liều 1 ml / con.

Thể trọng gia cầm trung bình	Lượng sản phẩm	Lượng nước vô trùng
0.500 kg	25 ml	975 ml
1.000 kg	50 ml	950 ml
1.500 kg	75 ml	925 ml
2.000 kg	100 ml	900 ml
3.000 kg	150 ml	850 ml
4.000 kg	200 ml	800 ml

Động vật nhai lại:

- Bê nghé, cừu, dê mới sinh: 20 mg hoạt chất / kg thể trọng (tương đương với 1 ml Fx plus[®] 20 Injectable solution / 10 kg thể trọng), điều trị cách nhau khoảng 12- 24 giờ, dùng trong 3 đến 5 ngày liên tục tùy theo mức độ nhiễm bệnh.
- Động vật đang lớn hoặc đã trưởng thành: liều đầu tiên với 10 mg hoạt chất / kg thể trọng (tương đương với 0.5 ml Fx plus[®] 20 Injectable Solution / 10 kg thể trọng), sau đó tiêm liều tiếp theo với 5 mg hoạt chất / kg thể trọng (tương đương với 0.25 ml Fx plus[®] 20 Injectable Solution / 10 kg thể trọng) cách nhau khoảng 12- 24 giờ trong 3 đến 5 ngày liên tục, tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh. Sản phẩm nên được dùng trực tiếp không pha loãng.

Lưu ý:

- Để tránh vấy nhiễm dung dịch cần khử trùng nắp cao su trước khi dùng kim tiêm đâm thủng.
- Không bơm không khí vào dung dịch thuốc.
- Sử dụng kim tiêm vô trùng
- Đối với gia cầm nên thay kim tiêm sau mỗi 500 – 1000 lần chích.
- Sát trùng vị trí chích
- Động vật nhai lại: Không tiêm nhiều hơn 5 ml tại 1 vị trí tiêm
- Tránh xa tầm tay của trẻ em và động vật
- Không pha trộn với bất kỳ sản phẩm nào khác
- Tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y.

Thời gian ngưng thuốc:

Gia cầm lấy trứng và thịt: 5 ngày sau lần điều trị cuối cùng.

Gia súc lấy thịt và sữa: 5 ngày sau lần điều trị cuối cùng.

Quy cách: Chai 100 ml

Bảo quản:

- Bảo quản ở nhiệt độ phòng (15°C- 27°C), tránh ánh nắng mặt trời
- Không đông đá sản phẩm

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:

LABORATORIO AVI-MEX, S.A. DE C.V.
Maiz No.18, col. Granjas Esmeralda, Del.
Iztapalapa C.P. 09810, Mexico City, Mexico

Nhập khẩu và phân phối:

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG
Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú,
quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84)28.6685.0901
Email: info@eastvet.vn