

## MEVAC LSD

**Thành phần:** Mỗi liều vaccine có chứa:

Virus Lumpy Skin Disease chủng Neethling  $\geq 10^{3.5}$  TCID<sub>50</sub>

Tá dược vừa đủ một liều

**Dạng bào chế:** Vaccine nhược độc, đông khô

**Chỉ định:**

Phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.

**Liều dùng:**

Bò, trâu: 2 ml/con, tiêm dưới da vùng cổ.

**Hướng dẫn sử dụng:**

Vaccine được hoàn nguyên bằng nước pha vô trùng kèm theo.

Sử dụng syringe vô trùng (16-gauge ¼ inch), hút chuyển 2-5 ml dịch pha cho vào lọ vaccine, trộn đều cho tan hết, sau đó hút toàn bộ phần vaccine đã hoàn nguyên chuyển về lọ nước pha đã hút một phần trước đó và trộn đều. Lúc này, dung dịch hoàn nguyên vaccine sẵn sàng cho sử dụng.

**Khuyến cáo chương trình vaccine:**

Chủng ngừa lần đầu:

Bê, nghé sinh ra từ bò, trâu mẹ đã tiêm ngừa hoặc đã nhiễm bệnh tự nhiên: chủng ngừa từ 3 tháng tuổi trở đi.

Bê nghé sinh ra từ bò, trâu mẹ chưa tiêm ngừa: tiêm chủng ở bất kỳ tháng tuổi nào.

An toàn cho gia súc mang thai (tất cả các giai đoạn của thai kỳ, hạn chế tiêm ngừa trong vòng một tuần trước và sau đẻ)

Chủng ngừa lặp lại: định kỳ hàng năm (12 tháng). Tốt nhất là tiêm ngừa cho gia súc trước thời điểm có nguy cơ (trước mùa lưu hành của côn trùng hút máu).

Trường hợp khẩn cấp (trong ổ dịch): Gia súc đã được chích ngừa có thể chích lặp lại sau 5-6 tháng kể từ mũi chích đầu tiên.

**Thời gian ngưng thuốc:** 0 ngày

**Tác dụng phụ:** Trong một vài trường hợp có sưng ở vị trí tiêm và mất đi mà không cần điều trị.

Giảm sữa tạm thời trong một vài trường hợp.

**Quá liều:**

Không có ảnh hưởng bất lợi nào ghi nhận ngoài tác dụng phụ đã nêu.

**Lưu ý:**

Chỉ chủng ngừa cho gia súc khỏe mạnh.

Chỉ sử dụng syringe và kim tiêm vô trùng.

Bảo quản vaccine nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc với ánh nắng và nhiệt độ cao trong khi chủng ngừa.

Tiêu hủy vaccine không sử dụng, cũng như vật dụng chứa vaccine, dụng cụ chủng ngừa theo quy định của địa phương.

Dùng hết vaccine khi đã hoàn nguyên (mở nắp), tốt nhất dung hết trong vòng 2 giờ sau khi hoàn nguyên. Không giữ lại vaccine thừa sau hoàn nguyên cho ngày hôm sau.

Cẩn thận tránh tiếp xúc với mắt, tay và quần áo trong khi thao tác với vaccine.

**Bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C – 8°C

**Quy cách:** lọ 10 liều; 25 liều kèm nước pha


**Xuất xứ:** Ai Cập

**Số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng:** Vui lòng xem trên nhãn gốc

**Số ĐKLH:** MDF-05

**Nhà sản xuất:** Middle East for Vaccines  
(MEVAC)

Second Industrial Zone-Extension Part  
No. 21, 22, 24, 25 El Salhya El Gdeda,  
Elsharkya Governorate, Ai Cập

**Nhập khẩu và phân phối:** **Công ty TNHH Thú Y Đông Phương**  
Số 20, đường số 8, khu phố 4, phường  
 An Phú,  
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: (+84)28.6685.0901 - Email:  
info@eastvet.vn