

## MEFLUVAC H9-16

**Mô tả:**

Vac xin chết chứa virus dùng cho tạo miễn dịch chủ động cho gia cầm subtype H9N2.

**Dạng bào chế:**

Hỗn dịch nước trong nhũ dầu .

**Thành phần:**

Hoạt chất: virus Cúm độc lực thấp H9N2  $\geq 8.0 \log_{10} EID_{50}$  (hàm lượng trước khi bất hoạt).

**Đường dùng và liều lượng:**

Tiêm bắp (cơ ức hoặc cơ đùi) hoặc tiêm dưới da cổ.

Liều lượng: 0,5 ml/con.

**Chương trình vac xin khuyến cáo:**

Meflufac H9-16 nên được chủng ngừa như sau:

- Gà thịt, chim cút: có thể chủng ngừa một liều duy nhất từ 1-7 ngày tuổi; tuy nhiên ở vùng áp lực bệnh cao theo mùa vụ, nên tái chủng.
- Gà tây, vịt: chủng đủ 2 liều, thời gian giữa mỗi liều từ 3-4 tuần.
- Gà đẻ, gà giống: chủng từ 3-4 liều:
  - + Liều thứ nhất: trong 2 tuần tuổi đầu.
  - + Liều thứ 2: Sau liều thứ nhất 3-4 tuần.
  - + Liều thứ 3: Sau liều thứ hai 8-10 tuần.
  - + Liều thứ 4: Tùy theo kết quả xét nghiệm huyết thanh của phòng Lab.

## Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C.

Không đông đá sản phẩm

## Quy cách:

Chai nhựa PET 500 ml (1000 liều).

## Hạn sử dụng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

## Chống chỉ định và cảnh báo:

Không (Nếu sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

## Khuyến cáo:

- Chỉ chủng ngừa cho gia cầm khỏe mạnh.
- Để vac xin ở nhiệt độ phòng (20-25 độ C) trước khi sử dụng.
- Lắc đều trước khi sử dụng.
- Sử dụng vac xin trong 1 lần sau khi đã mở nắp.
- Sử dụng trong 03 giờ sau khi mở nắp.
- Không pha trộn với các vac xin khác.
- Trong trường hợp tiêm nhầm vào cơ thể người, đến ngay cơ sở y tế và mang theo tờ rơi của sản phẩm.

**Thời gian ngưng thuốc:** Không.

## Nhà sản xuất:



### Middle East for Vaccines (MEVAC)

Second Industrial Zone-Extension Part No. 21, 22, 24, 25 El Salhya  
El Gdeda, Elsharkya Governorate, Ai Cập.

## Nhập khẩu và phân phối:



### Công ty TNHH Thú Y Đông Phương

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.  
HCM.

ĐT: 028.6685.0901

Email: Info@eastvet.vn

