

Chỉ dùng trong thú y

AMPUCOXIN SOL

Dạng sản phẩm: Dung dịch

Đường dùng: Đường miệng

Thành phần: Mỗi 1 lít sản phẩm có chứa:

Amprolium hydrochloride 200g

Chất mang vừa đủ

Chỉ định:

Phòng ngừa và điều trị cầu trùng trên gà và gà tây.

Liều dùng:

1) Điều trị cầu trùng: Pha 6ml Ampucoxin sol trong 10 lít nước uống (tương đương 0.012% Amprolium) dùng trong 3 ~ 5 ngày liên tục.

2) Điều trị cầu trùng (trường hợp nặng): Pha 12ml Ampucoxin sol trong 10 lít nước uống (tương đương 0.024% Amprolium) dùng trong 3 ~ 5 ngày liên tục.

3) Sau khi tiêm vaccine cầu trùng: Sau khi tiêm vaccine cầu trùng 10 ngày, pha 2,5 ~ 3,0ml Ampucoxin sol trong 10 lít nước uống (tương đương 0.005 – 0.006% Amprolium) và dùng trong 48 tiếng.

Thời gian ngưng thuốc:

Gà và gà tây: 1 ngày

Lưu ý:

Chỉ dùng cho những loài được chỉ định.

Không kết hợp với các thuốc khác có cùng thành phần.

Không sử dụng cho gà đẻ.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, trong bóng tối ở nhiệt độ phòng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách: Chai 1 lít

Nhà sản xuất:



KOREA THUMB VET Co. LTD.

470-15 Seonhwa-or, Iksan-si,

Jeollabuk-do, South Korea

Nhà phân phối:



CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú,

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (+84)28.6685.0901

Email: info@eastvet.vn