


14.5X25CM

FUGACA

**ĐẶC TRỊ GIUN SÁN KÍ SINH TRÊN ĐƯỜNG TIÊU HÓA
VÀ HÔ HẤP TRÊN GIA SÚC, GIA CẨM**



DUNG DỊCH
UỐNG



THỂ TÍCH THỰC
1 LÍT

ANTIBIOTIC

THÀNH PHẦN

Trong 1ml
Albendazole 100mg
Tá dược vừa đủ..... 1ml

CÔNG DỤNG

Phòng ngừa và trị bệnh nhiễm trùng giun đũa (ở mọi giai đoạn: trứng ấu trùng, con trưởng thành), giun phổi (kể cả trứng), sán (đầu và đốt sán), sán lá gan ở trâu, bò, bê, nghé, dê và cừu trong các trường hợp nhiễm:

- Giun tròn dạ dày - ruột ở mọi giai đoạn trứng-ấu trùng-giun trưởng thành: Haemochus, Bunostomum, Chabertia, Nematodius, Oeophagostomum, Strongyloides, Ostertagia, Cooperia, và Trichostrongylus spp.
- Giun phổi (kể cả trứng) Dictyocaulus viviparus và Dictiocaulus filaria.
- Sán dây (đầu và đốt sán) Moniezia.
- Sán lá gan Fasciola hepatica ở trâu bò, bê, nghé, dê và cừu.

LIỀU DÙNG

Dùng thuốc bằng đường uống, thuốc đã pha vào trong nước nên sử dụng 24 giờ.

- Gia cầm: Trị giun, sán: 1ml/10 - 12kg thể trọng.
- Heo: 1ml/10kg thể trọng
- Dê, cừu: 1ml/20kg thể trọng, Trị sán lá gan: 1ml/10kg thể trọng.
- Bê, nghé và trâu bò: 1ml/12kg thể trọng. Trị sán lá gan: 1ml/10kg thể trọng.
- Trường hợp nhiễm khuẩn nặng: Lặp lại 2 lần sau 3-4 tuần.
- Thời gian ngưng sử dụng: 12 ngày trước khi giết thịt và 4 ngày trước khi lấy sữa.
- Chống chỉ định: không sử dụng trong 45 ngày đầu thai kỳ.

CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y
SĐK: MGP-53



Phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG

số 7-9, đường số 7 khu phố 4, P. An Phú, Q.2
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028.6685.0901 | Email: info@eastvet.vn

Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OMEGA PHARMA

Lô B1-2 - khu B1 - đường N5 - KCN Tân Phú Trung
Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3636 1760

BẢO QUẢN: NƠI KHÔ MÁT, TRÁNH ÁNH SÁNG TRỰC TIẾP, TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM.

