

innovac L-PRRS

Vắc xin phòng ngừa các thiệt hại gây ra trên lợn do nhiễm vi rút hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS)

THÀNH PHẦN: chứa vi rút PRRS chủng GX16
(hiệu giá tối thiểu $10^{3.0}$ CCID 50 / mL)



LIỀU LƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP CHỨNG NGỪA:

- Sử dụng 2.0 ml cho lợn con khỏe mạnh vào lúc từ 3 ngày tuổi trở đi bằng đường xịt mũi. Xịt nguyên 2 ml vào một bên mũi hoặc 1 ml sản phẩm cho mỗi bên mũi.
- Sử dụng 2 ml cho lợn nái bằng đường tiêm bắp cho toàn đàn từ 3-4 tháng hoặc chủng ngừa từng cá thể vào 5-3 tuần trước khi đẻ.

TUỔI CHỨNG NGỪA:

- Chủng ngừa vaccine cho lợn con lúc 3 ngày tuổi để tạo miễn dịch chủ động.
- Chủng ngừa định kỳ cho tất cả đàn lợn nái sau mỗi 3-4 tháng hoặc từng cá thể lúc 5 tuần và 3 tuần trước khi sinh để tạo miễn dịch thụ động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Đối với đường xịt mũi, sử dụng đầu xịt đi kèm với sản phẩm và gắn lên ống tiêm ở đầu gắn kim tiêm để chủng ngừa. Gắn đầu xịt vào ống tiêm và bắt đầu tiêm chủng. Không chế lợn con bằng cách giữ các chân trước và hướng đầu lên trên. Bịt một bên mũi và nhỏ liều tương ứng vào bên mũi còn lại. Nên không chế lợn con cho đến khi hít toàn bộ thuốc vào.
- Đối với đường tiêm bắp, sử dụng ống tiêm và kim tiêm vô trùng để chủng ngừa.

BẢO QUẢN:

- Trong thời gian dài, giữ vaccine đông lạnh ở nhiệt độ dưới -70 độ C.
- Trong thời gian ngắn không quá 2 tuần, giữ đông lạnh vaccine ở nhiệt độ dưới -20 độ C.

HẠN SỬ DỤNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH:

Chai 100 mL (50 liều), 250 mL (125 liều) hoặc 500 mL (250 liều).

Nhà sản xuất: LABORATORIO AVI-MEX, S.A, DE C.V.
Maiz No.18, Coj. Granjas Esmeralda, Iztapalapa, Mexico.

Nhập khẩu và phân phối:



Công TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG
Số 7 - 9 đường số 7, khu phố 4, phường An Phú,
thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 028.6685.0901